

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

 MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE  
 DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE  
 ET DE LA FORÊT

 SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX  
 Ancienne Conserverie de CASAMOZZA  
 LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



## EDITION CORSE

 Bulletin Technique N° 172  
 du 31 Mai 1990

C'est le dernier bulletin pour  
tous ceux qui n'ont pas renouvelé  
leur abonnement

### VIGNE

#### \*\* mildiou

Les précipitations des 26 et 27 mai ont pu être localement abondantes (MIGLIACCIARO 23 mm le 27, SARTENE 35 mm, mais SAN GIULIANO 2,5 mm et LUCCIANA 8 mm). Les traitements sont lessivés dès que les précipitations atteignent les 20 mm et les risques de sortie de mildiou augmentent après la pluie. Renouveler donc le traitement **anti-mildiou** dans les parcelles sensibles. Toutefois dans la majorité des parcelles les risques sont faibles.

: Les spécialités à base de phenylamides (ACYLON, :  
: CALTAN, PULSAN, SIRDAT, TAIREL, GALBEN, VAMIN) ne :  
: doivent pas être appliqués **plus de 3 fois par an**, :  
: (pour éviter tout risque d'apparition de souches :  
: résistantes) :

#### \*\* oïdium

Préférez un soufrage en pleine floraison et sur les cépages sensibles maintenez la protection après floraison.

#### \*\* botrytis

Actuellement aucune protection contre cette maladie ne se justifie.

### PROCYMIDONE/VINS/U.S.A.

Dans l'attente de la fixation durable par les autorités américaines d'une norme légale concernant la limite maximale de résidus de procymidone dans les vins importés, les viticulteurs dont les vins sont susceptibles d'être exportés vers les Etats-Unis sont invités à suivre les recommandations suivantes en matières de protection contre la pourriture grise de la vigne, lors de la campagne en cours :

- . Eviter l'usage de la procymidone
- . Utiliser des matières actives de la même famille chimique et d'action comparable, autorisée aux U.S.A, l'iprodione (60 ppm/raisin) ou tolérée la vinchlozoline (6 ppm/raisin).

### \*\* Cochenilles farineuses de la vigne

Les sorties de jeunes larves augmentent dans les parcelles atteintes. Prévoyez un traitement pour la semaine du 11 au 17 juin avec EKALUX, ULTRACIDE ou spécialités à base de parathion.

### ARBRES FRUITIERS

#### \*\* Tordeuse orientale du pêcher


Maintenir la protection lorsque les dégâts sont observés sur les pousses. ( Traitements interdits sur variétés en cours de récolte)

#### \*\* Pucerons

Ils pullulent sur plusieurs espèces fruitières. De nombreux produits sont utilisables.  
Alternez les matières actives.

#### \*\* Capnode sur pruniers

Des dégâts ont été observés en MARANA. Rappelons que les larves de ce coléoptère sont blanches, molles et aplaties, sans pattes. Elles attaquent les racines et base des troncs des jeunes sujets de pruniers, abricotiers, pêcheurs, amandiers, cerisiers. Elles creusent des galeries sinueuses sous corticales qui se remplissent d'une fine sciure. La lutte est difficile.



Larve

---> Tout sujet dépérissant n'est pas forcément parasité par les capnodes.

---> Faites identifier la larve avant toute intervention.

:  
:  
:  
: Nous poursuivons cette année encore, les prospections  
: de **sharka** dans les vergers de prunus.  
:  
: N'hésitez pas à nous signaler les arbres douteux.  
:  
: Ce parasite est dangereux.  
:  
:

## CULTURES MARAICHERES

### **\*\* Tomate**

Prévenir les risques de contamination de la maladie bronzée de la **tomate** T.S.W.S. (Tomato Spotted Wilt Virus) en se procurant des plants sains issus de semis ou provenant de pépinières indemnes de virose.

### **\*\* Melons, pastèques**

Appliquer une protection fongique préventive avec un produit de contact anti-mildiou.

### **\*\* Pomme de terre - aubergine**

#### Doryphore

Vérifier la présence de larves, traiter au besoin (Cf bulletin du 6 avril n° 168).

(C) - SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX 1990 - Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.